



Behandling med azathioprin

HANDELSNAVN: _____

Hvad er azathioprin?

Azathioprin er et middel mod gigt. Handelsnavnet er ofte Imurel.

Hvordan virker azathioprin?

Azathioprin virker ved at dæmpe immunforsvaret, hvilket nedsætter gigtens aktivitet.

Azathioprin helbreder ikke din sygdom, men bremser sygdommens udvikling. Virkningen viser sig ved at hævelse, ømhed og stivhed i dine led aftager.

Hvis gigten har givet dig skader i leddene, vil disse ikke bedres. Behandling med azathioprin kan dog begrænse udviklingen af nye forandringer. Azathioprin virker som regel først efter 4-12 ugers behandling.

Omkring 2/3 af dem, der starter på behandlingen, oplever en effekt. Man kan ikke på forhånd afgøre, hvem der vil have gavn af azathioprin.

Hvordan tages behandlingen?

Azathioprin gives som tabletter. Tabletterne fås på 25 mg eller 50 mg. Den sædvanlige dosis er 100-150 mg dagligt.

Tabletterne sluges hele med et glas vand, gerne i forbindelse med et måltid. Du kan tage alle tabletterne på én gang, eller fordele dem over dagen.

Det kan være nødvendigt at ændre dosis, enten fordi du ikke har opnået den ønskede virkning eller på grund af bivirkninger. Ændringer skal altid ske i samarbejde med lægen, da det kan være farligt selv at ændre på antallet af tabletter.

Hvor længe gives behandlingen?

Hvis azathioprin har den ønskede virkning, må du regne med, at behandlingen varer i flere år.

Hvis du ikke har mærket en virkning efter 4-6 måneder, vil din læge sandsynligvis erstatte eller supplere behandlingen med andet medicin mod gigt.

Glemte at tage azathioprin

Hvis du glemmer en dosis, skal du ikke tage dobbelt dosis næste dag, men i stedet følge den normale ordination.

Bivirkninger

De fleste tåler azathioprin uden væsentlige bivirkninger.

Almindelige bivirkninger er:

- Kvalme, diarré og manglende appetit er de mest almindelige bivirkninger. Generne ses især i starten af behandlingen, og forsvinder ofte med tiden, selvom du fortsætter med at tage azathioprin. Hvis du får kvalme, anbefaler vi at tage halv dosis morgen og aften eller at tage alle tabletterne før sengetid.
- Nedsat produktion af blodplader og hvide blodlegemer ses i sjældne tilfælde. Dette kan bl.a. medføre små blødninger i hud og slimhinder, som kan vise sig ved små røde eller blå pletter på huden, næseblod eller blødning fra tandkødet. Oplever du nogle af disse bivirkninger, skal du kontakte lægen.
- Påvirkning af leveren ses meget sjældent. Dette giver som regel ingen symptomer, men vil kunne ses i dine blodprøver.
- Overfølsomhed er sjælden, men kan vise sig ved et kløende udslæt på ben, arme og krop og/eller ved feber. Har du mistanke om overfølsomhed, skal du stoppe med at tage azathioprin og kontakte din læge eller sygeplejerske på behandlingsstedet.
- Hårtab ses meget sjældent. Håret vokser ud igen, hvis du stopper med azathioprin.



Du kan læse en samlet oversigt over bivirkninger i indlægssedlen, som ligger i æsken med azathioprin.

Forholdsregler, når du er i behandling med azathioprin

Infektioner

Hvis du får en alvorlig infektion, hvor du f.eks. skal have antibiotika, bør du kontakte din reumatolog, da det kan være nødvendigt at holde pause med behandlingen. Du behøver ikke holde pause ved forkølelse, små overfladiske hudinfektioner eller hvis du er kvinde og har ukompliceret blærebetændelse.

Operationer

Som udgangspunkt fortsættes behandlingen.

Vaccinationer

Vaccination kan gives efter aftale med din læge.

Azathioprin og anden medicin

Azathioprin kan normalt tages sammen med andre lægemidler.

- Allopurinol, som anvendes ved behandling af urinsyreigt (podagra) kan forstærke virkningen af azathioprin, og det kan derfor være nødvendigt at nedsætte dosis.

Du må gerne tage smertestillende medicin som f.eks. paracetamol og ibuprofen sammen med azathioprin.

Der er ingen problemer ved samtidig brug af P-piller.

Vi anbefaler, at du taler med din læge om brugen af anden medicin sammen med azathioprin.

Graviditet og amning

Såfremt du planlægger graviditet, bør du drøfte dette med din læge.

Kan normalt anvendes efter aftale med din læge.

Blodprøvekontrol

Du skal have taget regelmæssige blodprøver for at vi kan opdage eventuelle bivirkninger til azathioprin.

Du får sædvanligvis taget blodprøver med 8 ugers mellemrum. Det er dog hyppigere i starten af behandlingen.

Ved blodprøverne kontrollerer vi bl.a. antallet af røde og hvide blodlegemer, blodplader og funktionen af din lever og nyrer.

Blodprøveresultaterne bliver set, og du bliver efterfølgende kontaktet, hvis der er behov for det.

Når du kommer til kontrol på behandlingsstedet, vurderer din læge/sygeplejerske sammen med dig, om azathioprin har den ønskede virkning på din gigt.

Yderligere spørgsmål?

Er du i tvivl eller har yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at spørge reumatologen eller kontakte dit behandlingsstedet.

Derudover henviser vi til indlægssedlen i pakken med medicin.